

	periphere Schmerzkatheter - Management und Verweildauer	Freigabe am: 02.06.2020 AA Erfurt-001894
	KANS/ alle	Rev. Nr.: 001 Seite 1 von 1

1. ALLGEMEINES

- 2 – 5 Tage Verweildauer, je nach Bedarf (Mobilisation) in Rücksprache mit operativer Fachrichtung
- Punktionsstelle muss reizlos sein
- Bestückung mit Ropivacain 0,2 %
- Maximaldosis Bolus 300 mg, Maximaldosis 24 h 900 mg
Ropivacain lt. Fachinformation

2. STANDARD

OP-Tag kontinuierlich via Pumpe und Beutel 4–14ml/h Ropivacain 0,2%

ab 1. Tag postOP 3 x täglich 10 ml (bis 20 ml) Ropivacain 0,2 % als Bolus

3. BESONDERHEITEN:

Knie TEP	liegender FK, nach Möglichkeit nicht bestücken, b.B. kontinuierliche Gabe s.o.
Amputation	kontinuierlich Ropivacain 0,2 % 4-14 ml/h für 3 bis 5 Tage
Kreuzbandplastik	Kontinuierlich bis zur Teilbelastung, ab Teilbelastungstag nicht mehr bestücken und Katheter entfernen
Schenkelhalsfraktur medial	FK kontinuierlich bis zur OP
lateral	Single-shot
Sympathikolyse	Kontinuierlich niedrig dosiert über mehrere Tage

Dosisanpassung zur Physiotherapie möglich!

	letzte Bearbeitung:	Prüfung:	Freigabe:	letzte Gültigkeitsprüfung:
Name:	Maiwald, Oliver	Morsbach, Kai	Liebl-Biereige, Simone	02.06.2020
Datum:	28.04.2020	02.06.2020	02.06.2020	